

**SZCZEPIENIA OCHRONNE
W PRAKTYCE LEKARZY
SPRAWUJĄCYCH
PROFILAKTYCZNAŃ OPIEKĘ
ZDROWOTNAŃ
NAD PRACOWNIKAMI**



Pracownicy świadczący niektóre rodzaje prac mogą być narażeni na różnego rodzaju substancje niebezpieczne dla zdrowia, mogące skutkować rozwinięciem się choroby. W grupie czynników szkodliwych szczególne miejsce zajmują czynniki biologiczne, takie jak bakterie, wirusy i grzyby wraz z wytwarzanymi przez nie toksynami. W zależności od rodzaju patogenu, wyróżnić można następujące drogi i mechanizmy szerzenia się zakażenia:

- droga pokarmowa (zakażenia fekalno-oralne, przez wodę i żywność, przeniesione rękoma),
- droga powietrzna (zakażenia kropelkowe, pyłowe, przez aerozol),
- droga związana z naruszeniem ciągłości tkanek,
- droga zakażenia przez nosicieli (wektory),
- droga kontaktowa

Według obowiązującego w Polsce prawa, pracodawca w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny jest obowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia, do których zalicza się m.in. szczepienia ochronne. Ich wykonywanie służy ochronie zdrowia pracowników i zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy jest jednym z zadań służby medycyny pracy. Według Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pracownikom przy wykonywaniu niektórych czynności zawodowych zaleca się przeprowadzenie szczepień ochronnych, których koszty wykonania oraz preparatów do ich wykonania ponosi pracodawca. Wyjątkiem jest szczepienie przeciw WZW typu B, które u uczniów szkół medycznych, studentów wyższych szkół medycznych oraz osób wykonujących zawód medyczny, narażonych na zakażenie HBV jest obowiązkowe i finansowane ze środków publicznych.

Obowiązkiem pracodawcy lub zlecającego wykonanie prac jest poinformowanie pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Niestety w Ustawie oraz w odpowiednim

akcie wykonawczym niefortunnie użyto słowa „wymaganego”, co sprawia trudności w interpretacji przepisów. Nie do końca jest bowiem wiadomo, czy podjęcie pracy jest uzależnione od bezwzględnego poddania się odpowiednim szczepieniom. Wydaje się jednak, że w związku, że są to szczepienia zalecane, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie dostępności do szczepionki i pokrycie kosztów jej zakupu. Decyzja o poddaniu się szczepieniu powinna należeć do pracownika. Podczas dokonywania wyboru, bardzo istotna jest rola lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Jego zadaniem jest między innymi poinformowanie pracodawcy o dostępności szczepionki przeciwko drobnoustrojom, na zakażenie którymi narażeni są pracownicy oraz o zasadności jej użycia.

Pracownikom lekarz powinien wyjaśnić istotność szczepienia, jego rolę ochronną, konsekwencje wynikające z nabycia choroby w przypadku niepoddania się szczepieniu oraz przedstawić potencjalne powikłania poszczepienne. Wywiad przeprowadzony przez lekarza bądź wykonanie w niektórych przypadkach odpowiednich badań laboratoryjnych pomoże wykluczyć te osoby, które mają już odporność na daną chorobę (nabytą naturalnie bądź wskutek uprzednich szczepień) i nie wymagają podania szczepionki.

W przypadku odmowy poddania się szczepieniu przez pracownika, fakt ten wraz z podaniem przyczyny powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej. Warto też poprosić pracownika o pisemne oświadczenie odmowy poddania się zaproponowanemu przez lekarza szczepieniu.

Poniżej podane zostały szczepionki przeciwko wybranym jednostkom chorobowym, których stosowanie jest zalecane u wybranych grup pracowniczych. Zalecenia wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności. Pojęcia „rekomendowane” użyto do zaleceń opisywanych w piśmiennictwie oraz w Programie Szczepień Ochronnych na

rok 2012, ogłoszonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy mieć świadomość, że podanie się niektórym szczepieniom (ujętym i nieujętym w niniejszej broszurze) miało miejsce u części pracowników w dzieciństwie, w ramach szczepień obowiązkowych. Sposób podania i schemat dawkowania każdorazowo wynikać będzie ze wskazań producenta konkretnej szczepionki lub zaleceń lekarskich.

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW TYPU B

OBOWIĄZKOWE

- u uczniów uczelni medycznych lub innych uczelni, w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
- u studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
- u osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- u pracowników wykonujących czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym (narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek).
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaź-

ną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią.

UWAGI

- u osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje się
- osobom z grup ryzyka zakażenia (*w przypadku pracowników – przede wszystkim personelowi medycznemu*) zaleca się określenie stężenia przeciwciał poszczepiennych nie wcześniej niż 4 tygodnie (zwykle 1–2 miesiące) po zakończeniu pełnego cyklu szczepień w celu określenia odpowiedzi szczepiennej
- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich

SZCZEPIENIE PRZECIWKO BŁONICY

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- u pracowników zatrudnionych przy czynnościach związanych z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub których praca związana jest z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na błonicę
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią.

UWAGI

- szczepionka monowalentna (d) lub skojarzona ze szczepionką przeciw tężcowi (Td)
- przy braku szczepienia podstawowego należy je przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta
- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich
- dawka przypominająca co 10 lat

SZCZEPIENIE PRZECIWKO OSPIE WIETRZNEJ

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią.

REKOMENDOWANE

- u pracowników medycznych, u których brak jest serologicznych dowodów odporności, dowodów na poddanie się szczepieniu czy przebycia ospy wietrznej w przeszłości

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich; typowo 2 dawki w odstępie 6 tygodni

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- u pracowników zatrudnionych przy czynnościach związanych z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, świadczących pracę w laboratorium z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związaną z narażeniem na zakażenie wirusem wścieklizny w laboratoriach wirusologicznych, w których prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny.
- u pracowników wykonujących czynności wymagające kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach

dach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią.

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich
- typowo: w ramach profilaktyki poekspozycyjnej – 5 dawek szczepionki (0, 3, 7, 14, 30 doba); w ramach szczepienia przedekspozycyjnego – 3 dawki (0, 7, 28 doba); po 12 miesiącach 1 dawka uzupełniająca; dawka przypominająca – 1 dawka 5 lat po zakończeniu szczepienia podstawowego (kolejne dawki co 5 lat lub z częstotliwością uzależnioną od miana przeciwciał)

SZCZEPIENIE PRZECIWKO TĘŻCOWI

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach związanych z usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
- przy czynnościach wymagających kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich
- szczepionka monowalentna lub skojarzona z antygenami innych drobnoustrojów
- u osób uprzednio zaszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych – dawki przypominające co 10 lat
- w ramach profilaktyki poekspozycyjnej – w zależności od czasu jaki upłynął od cyklu podstawowego szczepienia czy podania ostatniej dawki przypominającej szczepionki

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW TYPU A

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, oraz przy pracach wymagających kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia
- osobom zatrudnionym przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
- przy czynnościach, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich
- typowo: schemat 2-dawkowy

SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

REKOMENDOWANE

- pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu oraz innym osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi

UWAGI

- corocznie; sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich

SZCZEPIENIE PRZECIWKO KRZTUŚCOWI

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW:

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

REKOMENDOWANE

- w niektórych krajach u personelu medycznego, szczególnie pracujących z dziećmi poniżej 12 miesiąca życia

SZCZEPIENIE PRZECIWKO ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

REKOMENDOWANE

- u młodych kobiet, zwłaszcza pracujących w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie); dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku życia lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat
- u pracowników medycznych, u których brak jest serologicznych dowodów odporności czy dowodów na poddanie się szczepieniu w przeszłości

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich
- typowo: schemat 2-dawkowy
- podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; należy ją podać nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia
- nie szczepić w okresie ciąży; przez 3 miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich
- jako dawka przypominająca u osób zaszczepionych w dzieciństwie – szczepionka poliwalentna przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością komponentów błoniczego i krztuścowego zawierająca acelularny komponent krztuścowy (dTpa)

SZCZEPIENIE PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WYWOŁANYM PRZEZ *STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE*

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich

SZCZEPIENIE PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WYWOŁANYM PRZEZ *NEISSERIA MENINGITIDIS*

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra

Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

REKOMENDOWANE

- dla mikrobiologów stale eksponowanych podczas hodowli *N. meningitidis*

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich (szczepionka skoniugowana lub nieskoniugowana (polisacharydowa))

SZCZEPIENIE PRZECIWKO KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach bezpośrednio związanych z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu
- przy czynnościach wykonywanych w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich; typowo: schemat 3-dawkowy (II dawka – 1–3 miesiący

po pierwszej dawce, dawka uzupełniająca – 5–12 miesięcy po II dawce); dawka przypominająca – 3 lata od zakończenia szczepienia podstawowego; kolejne dawki przypominające co 3–5 lat

SZCZEPIENIE PRZECIWKO CHOLERZE

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich; typowo: 2 dawki w odstępie jednego tygodnia

SZCZEPIENIE PRZECIWKO DUROWI BRZUSZNEMU

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach związanych z usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego

wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich; typowo; szczepionka pełnokomórkowa – schemat 3-dawkowy, dawki przypominające – co 3–5 lat; szczepionka polisacharydowa – szczepienie jednorazowe

SZCZEPIENIE PRZECIWKO OSTREMU ZAPALENIU ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO (CHOROBA HEINEGO-MEDINA – „POLIOMYELITIS”)

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich – jako dawka przypominająca u osób zaszczepionych w dzieciństwie

SZCZEPIENIE PRZECIWKO ŻÓŁTEJ GORĄCZCE

ZALECANE WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- przy czynnościach podejmowanych w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych

przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią

REKOMENDOWANE

- wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych; dotyczy w szczególności krajów Afryki oraz Ameryki Południowej

UWAGI

- sposób podania i schemat dawkowania wedle wskazań producenta lub zaleceń lekarskich; dawki przypominające – co 10 lat; szczepienia są wykonywane w punktach szczepień, które uzyskały stosowne rekomendacje

PIŚMIENNICTWO

1. *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012.40)*
2. *Program Szczepień Ochronnych na rok 2012 – Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71)*
3. *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2011.182.1086)*
4. *Mrożek-Bydzyń D: Wakcynologia praktyczna. amedica-press, wydanie II, 2009*
5. *Cianciara J, Juszczyk J: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Czelej sp z o.o., Lublin, 2007*
6. *Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2004.125.1317 z późn. zm.)*
7. *Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570 ze zm.)*



Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy

Projekt edukacyjny współfinansowany przez:



Łódź, 2012